

การตายของมารดา ปี 2564

203 ราย + 97 ราย = 300 ราย


ขณะตั้งครรภ์
ถึงหลังคลอด 42 วัน

ตายหลังคลอด
มากกว่า 42 วัน

รวม




สาเหตุการตายของมารดา การตายใน sw.



- อันดับ 1** การตายจากความผิดปกติอื่นๆ ของมารดา
- อันดับ 2** การตกเลือดของมารดา
- อันดับ 3** โรคความดันโลหิตสูงของมารดา
- อันดับ 4** การติดเชื้อของมารดา และการติดเชื้ออื่นๆ ของมารดา
- อันดับ 5** การตั้งครรภ์นอกมดลูก

การตายนอก sw.



- อันดับ 1** การตายจากความผิดปกติอื่นๆ ของมารดา
- อันดับ 2** โรคความดันโลหิตสูงของมารดา
- อันดับ 3** การตกเลือดของมารดา
- อันดับ 4** การติดเชื้อของมารดา และการติดเชื้ออื่นๆ ของมารดา
- อันดับ 5** การทำแท้งของมารดาและการแท้งบุตร


สาเหตุอันดับหนึ่งของความผิดปกติของแม่ ที่นำไปสู่การสูญเสียปีสุขภาวะจากการป่วยและพิการ และตายก่อนวัยอันควร (DALYs) ในแม่แต่ละกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ	สาเหตุความผิดปกติ	DALY (ปี)	ร้อยละ
5-14 ปี	การทำแท้งของแม่และการแท้งของลูก	692	33.9
15-29 ปี	แม่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดและมดลูกแตก	4,456	20.3
30-44 ปี	ความผิดปกติอื่นๆ ของแม่	3,760	22.6
45-90 ปี	การเสียชีวิตของแม่ระยะหลังตั้งครรภ์	556	32.7

สถานการณ์เด็กตาย (ต่อ 1,000) ระหว่าง พ.ศ. 2554 - 2562

40% ของการตายในขวบปีแรกเกิดในช่วง 28 วันหลังคลอด
25% ตายใน 7 วันแรกเกิด

อัตรา (ต่อเกิดมีชีวิต 1,000 คน)



หมายเหตุ : สำหรับกลุ่มอายุ 0-14 ปี ใช้ประชากรกลุ่มอายุ 0-14 ปี เป็นตัวหาร

ปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆ ที่เป็นสาเหตุ การสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY) ของเด็กไทย

สาเหตุ / โรค	ปัจจัยเสี่ยง	DALY (ปี)
ความผิดปกติของการก่อกำเนิด	น้ำหนักรกเกิดต่ำและคลอดก่อนกำหนดของการก่อกำเนิด	42,821
การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง	การมีภาวะพอมแห้ง ในเด็กต่ำกว่า 5 ปี	37,821
	ไม่ได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในเด็กต่ำกว่า 6 เดือน	9,782
	ภาวะเตี้ยแคระในเด็กต่ำกว่า 5 ปี	5,469
โรคอุจจาระร่วง	การมีภาวะพอมแห้ง ในเด็กต่ำกว่า 5 ปี	16,970
	ไม่ได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในเด็กต่ำกว่า 6 เดือน	5,231
	ไม่ได้กินนมแม่ต่อเนื่องในเด็กอายุ 6-23 เดือน	1,708